

31 10 070  
H 06 07/02  
7. Mai 1981  
25. November 1982



① BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND  
② Offenlegungsschrift  
③ DE 31 18 072 A1



DEUTSCHES  
PATENTAMT

- ① Anmeldedatum
- ② Anmeldetag
- ③ Offenlegungstag

P. 31 18 072 A  
7. 5. 81  
25. 11. 82

Int. Cl. 2:  
B 01 D 17/04  
B 01 D 11/06  
B 01 J 13/00

DE 31 18 072 A1

① Anmelder:  
Hewlett, Christo-Christien, Dr. rer. nat. Dr. med., 8000  
Wittmannshausen, DE

② Erfinder:  
gleiches Anmelder

③ Nachforschungsgebiete gem. § 48 Abs. 1 Satz 1 PatG:  
DE-AB 23 94 000  
DE-AB 12 27 117  
US 23 45 000  
DE-Abstr. Römisch, Christo-Christien, 7. Auflage, 1972,  
Seite 1020 bis 1022;  
US-2: Journal of the American Oil Chemists Society Vol. 52,  
1975, Seiten 25 bis 26;

BEST COPY AVAILABLE

④ Verfahren zur Trennung von Gasförmigen Bestandteilen aus wässrigen Katalysatör-Lösungen in präparativen Zwecken und/oder zum Bestimmen eines Analyten in wässriger Phase

Es wird ein Verfahren zur Entfernung festlicher Bestandteile aus wässrigen katalytischen Lösungen beschrieben. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß die physikalischen und chemischen Eigenschaften, insbesondere auch der erfindlichen Katalysatör in der wässrigen Lösung erhalten bleiben. Sie werden dadurch einem oxidativen und reduktiven Nachweis oder einer weiteren Aufarbeitung zugänglich. Das Extraktionsverfahren beruht auf der Verwendung von Mischungen organischer Lösungsmittel mit einer wasserunlöslichen Katalysatör, die eine Oberflächenspannung < 25 dyn/cm hat, und einer Katalysatör mit geringer Wasserlöslichkeit und einer Oberflächenspannung < 20 dyn/cm. Der Anteil der wasserunlöslichen Katalysatör beträgt 50 bis 90 Vol.-% der Lösungsmischungen. Katalysatörkonzentrationen sind bei der Flüssig-Flüssig-Extraktion von den katalytischen Lösungen in wässriger Phase auch in einem wässrigen Zustand der wässrigen Phase - im Gegensatz zu den bisher bekannten Extraktionsverfahren - keine Zerschneidung des Systems, in der insbesondere katalytische Analyten mit organischen Eigenschaften präzipitieren und ausfallen entstehen sind.

(31 18 072)

DE 31 18 072 A1

3118072

23.11.81

DE 3118072 A1

Patentansprüche

1. Verfahren zur Trennung von fettlöslichen Stoffen aus wässrigen Kolloidlösungen, dadurch gekennzeichnet, daß man einer lipophilen Substanzen enthaltenden Kolloidlösung eine Mischung aus einem wasserunlöslichen organischen Lösungsmittel mit einer Oberflächenspannung  $< 25$  dyn pro cm und einem organischen Lösungsmittel mit geringer Wasserlöslichkeit und/oder einer Oberflächenspannung  $< 20$  dyn/cm zufügt, die beiden Flüssigphasen miteinander durch Schütteln durchmischt und anschließend voneinander trennt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die organische Lösungsmittelphase ein geringeres oder höheres spezifisches Gewicht als die wässrige Phase hat.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als wasserunlösliches organisches Lösungsmittel mit geringer Oberflächenspannung ein Aliphater, ein aliphatischer Äther oder Thioäther mit 6 oder mehr Kohlenstoffatomen, ein Halogenkohlenstoff oder Halogenkohlenwasserstoff mit einer Oberflächenspannung  $< 25$  dyn/cm (gegen Dampf oder Luft) für die Lösungsmittelmischung verwendet wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Lösungsmittelkomponente mit geringer Wasserlöslichkeit und/oder geringer Oberflächenspannung ( $< 20$  dyn/cm gegen Dampf oder Luft) ein Alkohol mit 5 bis 12 Kohlenstoffatomen, ein primäres, sekundäres oder tertiäres Amin mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen, ein aliphatischer Monoalkyläther von Äthylenglykol mit 7 bis 12 Kohlenstoffatomen, ein Dialkyläther von Diäthylenglykol mit 8 bis 16 Kohlenstoffatomen oder Mischungen derselben verwendet wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Volumenanteil der wasserunlöslichen Komponente 50 bis 90% der organischen Lösungsmittelmischung beträgt.
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Vermischen einer wässrigen Kolloidlösung mit der organischen Lösungsmittelmischung zwischen den Freigrenzen und den Taupunkten der Flüssigphasen erfolgt.

3118072

23.11.81

- 2 -

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei Kolloidlösungen biologischer Herkunft das Vermischen der wässrigen Lösung mit der organischen Lösungsmittelmischung bei einer Temperatur zwischen 4°C und 60,5°C, günstigenfalls zwischen 20°C und 31°C erfolgt.
8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Durchmischung der Lösungen manuell oder automatisch erfolgt.
9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß nach Durchmischung die Phasentrennung der Lösungen nach einem
- 10 Verfahren erfolgt, das die unterschiedlichen spezifischen Dichten der Phasen berücksichtigt.
10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Abziehen der Phasen manuell oder automatisch erfolgt.
11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die wässrige einen Analyt enthaltende Phase zu analytischen oder präparativen Zwecken weiterverarbeitet wird.
12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Aufarbeitung von Flüssigkeiten biologischer Herkunft ein chemischer, biologischer, biochemischer oder immunologischer Nachweis eines Analyts in der delipidierten wässrigen Phase ausgeführt wird.

61

3118072

23.11.81

Verfahren zur Trennung von lipophilen Bestandteilen aus wässrigen Kolloid-Lösungen zu präparativen Zwecken und/oder zum Nachweis eines Analyts in wässriger Phase

- 5 Zahlreiche Stoffe, die sich in organischen Lösungsmitteln lösen, die jedoch in wässrigem Medium unlöslich sind, können in Form einer Emulsion, d.h. in Gegenwart von niedermolekularen und/oder hochmolekularen Verbindungen mit amphiphilen Eigenschaften dennoch in
- 10 der wässrigen Phase in Lösung gebracht werden. Insbesondere bei Naturstoffen, aber auch bei synthetischen Produkten können lipophile Stoffe (z.B. Neutralfette, fettlösliche Farbstoffe) die Weiterverarbeitung von hydrophilen Substanzen in der wässrigen Phase beeinträchtigen.
- 15 Sie müssen daher zum Zwecke der weiteren Aufarbeitung beseitigt werden. Verschiedene Verfahren sind entwickelt worden, die eine Extraktion von lipophilen Stoffen aus stabilen wässrigen, polymerhaltigen Lösungen ermöglichen (z.B. Extraktion mit Chloroform/Methanol bzw. Äthanol;
- 20 Isopropyläther/Butanol; Halogenkohlenwasserstoffen; Äther/Methanol bzw. Äthanol). Diese Verfahren erweisen sich jedoch für die Untersuchung und/oder Verarbeitung eines wasserlöslichen Polymers, das sich durch seine Eigenschaften als Detergens auszeichnet, als unzureichend, denn typische in der wässrigen Phase erhaltene Merkmale des Analyts werden durch diese Behandlung beseitigt. In der Biochemie wird der Verlust dieser Merkmale als "Denaturierung" bezeichnet.
- 25 Häufig ist hingegen eine Beseitigung von störenden lipophilen Bestandteilen aus der wässrigen Kolloidlösung unter der Erhaltung der physikochemischen und/oder biologischen Eigenschaften eines Analyts in der wässrigen Phase zum Zwecke der weiteren Aufarbeitung notwendig. In einzelnen Fällen hat sich eine Extraktion der Lipide in einem
- 30 Zweiphasensystem als geeignet erwiesen: z.B. Äther/Wasser;

3118072

23.11.81

- c. 4

Halogenkohlenwasserstoffe bzw. Halogenkohlenstoffe/  
Wasser). Bei wässrigen Kolloidlösungen, die lipophile  
Bestandteile enthalten, ist jedoch bei diesen Verfahren  
eine ausreichende Durchmischung der Flüssigphasen nicht  
5 gewährleistet. Darüberhinaus bildet sich eine Zwischen-  
phase, in der sich insbesondere ein Analyt mit Deter-  
gentieneigenschaften anreichert. Er wird dadurch dem  
wässrigen Medium (für den Nachweis und/oder die weiter-  
re Verarbeitung) entzogen. Ein Zusatz von neutralen Deter-  
10 gentien (z. B. Polyäthylenoxyderivaten) oder anionischen  
Seifen kann die Anreicherung von Polymeren wie z. B. Pro-  
teinen in der Zwischenphase nicht verhindern.

Überraschender Weise wurde festgestellt, daß eine Vorbe-  
handlung von wässrigen kolloidalen Lösungen, die lipo-  
15 phile Bestandteile in emulgierter Form enthalten, mit einer  
Mischung eines wasserunlöslichen organischen Lösungsmit-  
tels mit geringer Oberflächenspannung ( $< 25$  dyn/cm gegen  
Dampf oder Luft) und einem niedermolekularen organischen  
Lösungsmittel mit nur geringer Wasserlöslichkeit, aber  
20 die Oberflächenspannung des Wassers stark herabsetzenden  
Eigenschaften eine Beseitigung der Lipide aus der wäs-  
rigen Kolloidlösung in einem Ausmaß ermöglicht, das bei  
ausschließlicher Verwendung eines wasserunlöslichen  
organischen Lösungsmittels oder Lösungsmittelgemisches  
25 nicht erreicht werden kann. Darüberhinaus wurde fest-  
gestellt, daß unter Verwendung eines Lösungsmittelgemisches  
mit den angegebenen Eigenschaften keine Phase zwischen  
der wässrigen und der organischen Phase ausgebildet wird,  
in der ein gegebenenfalls zu untersuchender polymerer  
30 Analyt sich anreichert. Ferner ergab sich, daß die biologi-  
schen und/oder physikochemischen Eigenschaften eines zu  
untersuchenden Analyts in der wässrigen Phase erhalten  
bleiben und somit einem z. B. immunologischen oder biolo-  
gischen Nachweis zugänglich sind, ohne daß ursprünglich  
35 in der wässrigen Kolloidlösung vorhandene lipophile Sub-  
stanzen den Nachweis störend beeinflussen.

3118072

23.11.81

Im Vergleich zu den erwähnten herkömmlichen Methoden zeichnet sich das Verfahren dadurch vorteilhaft aus, daß es in Anbetracht der nur geringen Mengen der zu verwendenden Lösungsmittelgemische für eine Aufarbeitung von Kolloidlösungen zeitsparend und weniger arbeitsintensiv ist, da sich für die weitere Aufarbeitung eines Analyten in der wässrigen Phase eine Beseitigung von organischen Lösungsmittelbestandteilen erübrigt.

10 Folgende organische Lösungsmittel mögen als Vertreter ihrer Verbindungsklasse aufgeführt sein:

I. Organische Lösungsmittel mit geringer Löslichkeit in wässrigem Medium und niedriger Oberflächenspannung

( $\leq 0$  dyn/cm)

15	$C_nH_{2n+m}-OH$	$n:5-10; m:0$ oder 2
	$C_nH_{2n+m}-NH_2$	$n:4-12; m:0$ oder 2
	$(C_nH_{2n+m})_2NH$	$n:3-6; m:0$ oder 2
	$(C_nH_{2n+m})_3N$	$n:3-6; m:0$ oder 2
	$(C_nH_{2n+m}-O-CH_2CH_2-)_2O$	$n:5-6; m:0$ oder 2
20	$C_nH_{2n+2}-(O-CH_2CH_2)_2-OH$	$n:3-6; m:0$ oder 2
	$C_nH_{2n+2}-CO-C_nH_{2m+2}$	$n:1-3; m:3-6$

II. Wasserunlösliche organische Lösungsmittel mit niedriger Oberflächenspannung ( $\leq 25$  dyn/cm)

25

Fluor-Chlorkohlenstoffe und Fluor-Chlorkohlenwasserstoffe  
Aliphate  
aliphatische Äther und Thioäther mit 6 oder mehr Kohlenstoffatomen

30

3118072

20.11.81

Folgende Beispiele mögen den Vorteil des neuentwickelten Verfahrens verdeutlichen:

Beispiel :

- 5 Jeweils 0,5 ml Serum werden 10 Minuten mit 1ml des organischen Lösungsmittels a bzw. der Lösungsmittelmischungen b bis e geschüttelt. Anschließend wird zentrifugiert und aus der wässrigen Phase die Lipidkonzentration gemessen. Die Ergebnisse zeigen, daß bei alleiniger Verwendung des
- 10 Fluor-Chlorkohlenstoffpolymer als organisches Lösungsmittel eine unzureichende Lipidextraktion erreicht wird. Bei der Verwendung der angegebenen Lösungsmittelgemische (in Vol. Teilen) wird hingegen eine Extraktion von Triglycerid bzw. Cholesterin bis zu 94%, für Phospholipid bis zu 85% erreicht
- 15 a. Fluor-Chlorkohlenstoffpolymer (Frigen 113 Polymer)  
 b. Cyclohexanol/Frigen 113 Polymer (25/75)  
 c. n-Hexanol /Frigen 113 Polymer (25/75)  
 d. 1-Heptanol/Frigen 113 Polymer (25/75)  
 20 e. 2-Heptanol/Frigen 113 Polymer (25/75)

	Triglycerid (mg/dl)	Cholesterin (mg/dl)	Phospholipid (mg/dl)
Serum nativ	1000	510	356
25 a. Extraktion a	510	254	164
" b. Extraktion b	34	-	98
" c. Extraktion c	34	10	55
" d. Extraktion d	36	13	65
" e. Extraktion e	34	13	84

30

3118072

23.11.61

7

## Beispiel 2

Extraktion von Lipiden in wässriger Kolloidlösung mit anderen als in Beispiel 1 angegebenen Lösungsmittelmischungen. 0,5 ml Serum wird mit 0,7 ml eines

- 5 organischen Lösungsmittels bzw. einer Lösungsmittelmischung in der gleichen Weise behandelt, wie in Beispiel 1 beschrieben. Die Ergebnisse zeigen den wesentlich höheren Effekt der angegebenen Lösungsmittelgemische bei der Lipidextraktion gegenüber den reinen wasserunlöslichen
- 10 Lösungsmitteln. Die in Klammern angegebenen Quotienten kennzeichnen das Mischungsverhältnis der Volumina der einzelnen Lösungsmittelkomponenten.

	Triglycerid (mg/dl)	Cholesterin (mg/dl)	Phospholipid (mg/dl)
15 Serum nativ	553	290	351
Serum + $CF_3CCl_3$ *	151	101	80
Serum + Frigen 113 Pol.*107	107	64	109
Serum + $CF_3CCl_3$ /			
n-Hexylamin (95/5) 12		16	21
20 " + $CF_3CCl_3$ /Diäthyl-			
lenglykolmonobutyl-			
Äther (80/20) 17	17	17	29
" + $CF_3CCl_3$ /			
n-Hexanol (75/25)* 33	33	24	41
25 " + $CF_3CCl_3$ /Diäthyl-			
lenglykoldiäthyl-			
Äther (95/5) 92	92	57	138
" + Frigen 113 Polym./			
n-Hexylamin (95/5) 17	17	13	20
30 " + Frigen 113 Polym./			
Diäthylenglykolmo-			
nobutyläther (80/20) *		15	51
" + Frigen 113 Polym./			
n-Hexanol (75/25) 31	31	20	80
35 " + Frigen 113 Polym./			
Diäthylenglykoldi-			
äthyläther (80/20) 82	82	54	81

\*geringfügige Niederschlagsbildung in der Zwischenphase



3118072

## Beispiel 3

Extraktion von Lipiden in Flüssigphase mit Hilfe weiterer Lösungsmittel bzw. Lösungsmittelgemische. Das Mischungsverhältnis beträgt 0,5 ml Serum und 0,7 ml organisches Lösungsmittel. Die in Klammern angegebenen Quotienten kennzeichnen das Mischungsverhältnis der Volumina der organischen Lösungsmittelkomponenten. Die Tabelle veranschaulicht den deutlich wirksameren Effekt der Lipidextraktion bei der Verwendung der angegebenen Lösungsmittelgemische.

	Triglycerid (mg/dl)	Cholesterin (mg/dl) *	Phospholipid (mg/dl)
2 Serum nativ	171	183	88
15 Serum + n-Hexan *	170	180	84
Serum + Diisopropyläther *	122	101	51
Serum + n-Hexan/n-Hexylamin			
(95/5)	3	1	0
Serum + Diisopropyläther/ n-Hexylamin (95/5)			
20	8	11	0
Serum + n-Hexan/Diäthylengly- kolmonobutyläther			
(90/10)	0	12	12
Serum + Diisopropyläther/Di- äthylmonobutyläther			
25 (90/10)	0	3	0
Serum + CF <sub>3</sub> CCl <sub>3</sub> /n-Octylamin			
(95/5)	0	13	10
Serum + CF <sub>3</sub> CCl <sub>3</sub> /n-Hexylamin			
30	34	30	18

\* geringfügige Eiweißpräzipitation in der Zwischen-Phase

3118072

#### Beispiel 4

Nachweis der Erhaltung der immunchemischen Eigenschaften eines komplexgebundenen antigenen Hüllpolymeren nach einer Delipidierung in Flüssigphase.

- 5 0,1 ml einer Lösung eines aus menschlichem Serum isolierten Lipoproteins ( High Density Lipoprotein ,HDL) wurden mit 0,3ml eines organischen Lösungsmittels nach Beispiel 1 ,Extraktionsverfahren a bzw. b 10 min im Schüttelautomaten geschüttelt. Anschließend wurden die Phasen durch Zentrifugation in einer
- 10 Laborzentrifuge getrennt. 20 µl der wässrigen Phase wurden mit 2ml 0,9%iger Kochsalzlösung verdünnt. 100 µl dieser Verdünnung wurden mit einem Antiserum gegen Apolipoprotein A1, einem Proteinbestandteil der HDL, gemischt. Die Lichtstreuung der sich bildenden Immunkomplexe mit Apolipoprotein A1 wurde über einen
- 15 Zeitraum von 2 Std. mit Hilfe eines Laser-Nephelometers gemessen.
- Die Messung ergab, daß die Reaktion mit nativer HDL, in der der antigene Analyt mit Lipid assoziiert ist, wesentlich langsamer verläuft als nach einer Delipidierung nach dem Extraktionsverfahren b. Die Vorbehandlung der Probe nach dem Extraktionsverfahren a führte zum gleichen Ergebnis im immunchemischen Nachweis wie im Falle der unbehandelten Probe. Während nach der Lipidextraktion nach Verfahren b das Maximum des immunnephelometrischen Signals nach 90 min erreicht ist, ist die Immunreaktion
- 20 nach Extraktion nach dem Verfahren a nach 2 Std. noch nicht beendet.

© BUNDESREP  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHE  
PATENTAMT

① Anmelder:  
Hoechst AG, 65926 F.

② Erfindungsgegenstand:  
Wasserlösliche D  
naphen Formel (1)

Es werden 10 mg von  
einem Modell nach  
Formel (1) in 100 ml  
einem 10 und 10, a  
oder 100 ml, 10  
Wasserlöslichen oder  
einer Substanz oder  
Verbindung, die 10-But  
Chloro-Gruppe in  
-SO<sub>2</sub>-I in einem  
einem Antisep  
Formel -SO<sub>2</sub>-I in 10  
für weiteren Antis  
on und 10 10 10  
Verbindung von 10

DE 3118072 A1

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**